


COVID19 CASIVIRIMAB / INDEVIMAB



Kriterien für Hoch-Risikoverlauf⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾:

- Höheres Alter (~≥60-65 Jahre)
- Adipositas (BMI ≥ 25-30kg/m²)
- Komorbiditäten
 - Herz-Kreislaufkrankungen incl. Bluthochdruck
 - Diabetes mellitus Typ 1&2
 - Chronische Lungenerkrankungen incl. Asthma/COPD
 - Chronische Leber u./o. Nierenerkrankungen
 - Krebserkrankungen
- Schwangere
- Immunsuppression (z.B. Cortison/MTX)/ Immunschwäche (z.B. HIV)
- Sonstige schwere Vorerkrankungen z.B.: Metabolische Syndrome, angeborene Anomalien, ... (individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung)

(1) Gemeinsame Stellungnahme der Fachgruppe COVRIIN, des STAKOB und der DGI zum Einsatz von monoklonalen Antikörpern bei COVID-19; (2) FDA-Empfehlung; (3) Casirivimab and indevimab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial; (4) Stiko Hinweise Risikogruppen